

# CONTRA-INDICATIES

**ALGEMEEN:** WANNEER IS EEN CUPPING BEHANDELING **NIET MOGELIJK?**

⌘ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

⌘ INFECTIES

⌘ TROMBOSE

⌘ KANKER

⌘ TIJDENS EN NA EEN CHEMOTHERAPIE BEHANDELING. VANAF 1 JAAR NA BEHANDELING KAN DIT WEL TERUG BESPROKEN WORDEN. INDIEN MOGELIJK OOK GRAAG MET OVERLEG VAN BEHANDELLENDE SPECIALIST.

⌘ LEVERFALEN, NIERFALEN, HARTFALEN

⌘ HEPATITIS B

---

**PLAATSELIJK:** CUPPING BEHANDELING IS MOGELIJK, MAAR **NIET IN DEZE REGIO.**

⌘ SPATADEREN

⌘ NA EEN OPERATIE < 6 MAANDEN. 6 MAANDEN WORDT ALS RICHTLIJN AANGEGEVEN. NA DEZE PERIODE KAN CUPPING WEL INGEZET WORDEN OM BIJVOORBEELD LITTEKENWEEFSEL TE VERZACHTEN EN VERKLEVINGEN LOS TE MAKEN.

⌘ HERNIA

⌘ ONSTEKINGEN (WONDES, HUIDONSTEKINGEN, ETC.)

⌘ FILLERS - WORDEN SNELLER AFGEVOERD